

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TỈNH YÊN BÁI
**CHI CỤC TRỒNG TRỌT
VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Yên Bái, ngày tháng 4 năm 2023

Số: /TTBVTV-NV

V/v tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn
phòng trừ dịch hại trên cây lúa từ nay
đến cuối vụ Đông Xuân 2022 - 2023

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ, hỗ trợ phát triển nông nghiệp
các huyện, thị xã, thành phố

Hiện nay (14.4.2023), sinh trưởng và phát triển của cây lúa vụ Đông xuân 2022 - 2023 đang ở giai đoạn đứng cái - làm đòng - trổ (diện tích lúa đã trổ khoảng 250 ha tại thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn). Trong điều kiện thời tiết hiện nay đang diễn biến phức tạp: nắng mưa xen kẽ, ẩm độ không khí cao, mưa phùn kéo dài là điều kiện rất thuận lợi cho các đối tượng dịch hại như: Bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, bệnh khô vằn, rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu đục thân,... phát sinh gây hại trên diện rộng. Nếu không phòng chống kịp thời sẽ ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng, chất lượng cây lúa vụ Đông xuân năm 2022 - 2023.

Để chủ động phòng chống dịch hại trên cây lúa từ nay đến cuối vụ Đông Xuân 2022 - 2023, đảm bảo năng suất, sản lượng theo kế hoạch. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị Trung tâm Dịch vụ, hỗ trợ phát triển nông nghiệp; các cơ quan chuyên môn liên quan thực hiện tốt những nội dung sau:

1. Thường xuyên thực hiện điều tra, theo dõi tình hình dịch hại trên cây lúa, đặc biệt chú ý đến bệnh đạo ôn. Thực hiện tốt công tác dự tính, dự báo tình hình dịch hại trên cây trồng để đưa ra các biện pháp chỉ đạo kịp thời, hiệu quả để phòng chống các đối tượng dịch hại, bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Phối hợp chặt chẽ với các xã, phường, thị trấn thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, xử lý kịp thời những phát sinh và có biện pháp tích cực phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do dịch hại trên cây lúa và các loại cây trồng.

2. Hướng dẫn người dân thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật phòng trừ dịch hại. Cụ thể:

- Đối với bệnh đạo ôn: Không bón phân đạm, không phun các chất kích thích sinh trưởng, phân bón lá và luôn giữ nước trong ruộng. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, phun phòng trừ bệnh đạo ôn bằng các loại thuốc có hoạt chất: *Isoprothiolane* (Fuji-One 40 EC, 40WP; Fuan 40 EC,...); *Azoxystrobin* (Trobin 250 SC, Sinstar 250 SC,...); *Azoxystrobin + Difenoconazole* (Amistar Top® 325 SC, Amylatop 325 SC,...); *Chitosan + Polyoxin* (Starone 20 WP,...)...; Những ruộng bị bệnh đạo ôn lá nặng phải thực hiện phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông trước trổ từ 5 - 7 ngày bằng các loại thuốc đặc hiệu.

- Đối với bệnh khô vằn: Trong điều kiện thời tiết nắng mưa xen kẽ rất thuận lợi cho bệnh khô vằn phát sinh gây hại, đặc biệt đối với những diện tích lúa đã trổ bông, nếu bệnh gây hại lên lá đòng sẽ làm giảm năng suất cây lúa. Cần phòng trừ bằng một trong những loại thuốc có hoạt chất như sau: *Validamycin* (Jinggangmeisu 5SL, 10WP; Tung vali 5SL, 5WP;...), *Hexaconazole* (Aicavil 100SC, Anvil®

5SC,...), *Azoxystrobin* (Azony 25SC, Trobin 250SC,...)... Làm sạch cỏ dại, bón phân cân đối hợp lý, đúng thời điểm, không bón lai rai,. Không bón đạm, thuốc kích thích sinh trưởng và phân bón qua lá trên các ruộng lúa bị bệnh.

- Đối với bệnh bạc lá, đốm sọc do vi khuẩn gây hại cần chủ động phòng chống bằng một trong những loại thuốc có chứa hoạt chất như sau: *Bismethiazol* (Sasa 25 WP, Xanthomix 20 WP, Benita 250 WP, Tigondiamond 800WP ...); *Kasugamycin* (Kasumin 2SL, Golcol 20SL...).

- Đối với rầy nâu, rầy lưng trắng: Khi mật độ rầy gây hại cao, có thể sử dụng một trong các loại thuốc có hoạt chất sau để phun trừ như: *Fenobucarb* (Bassa 50EC, Bascide 50EC, Nibas 50EC...); *Thiamethoxam* (Actara® 25WG, Amira 25WG,...); *Abamectin* (Abakill 3.6EC, Abatox 3.6EC, Shertin 5.0EC...); *Nitenpyram* (Dyman 500WP, Fonica 600WP, ...). Sau khi phun thuốc 1 - 2 ngày phải kiểm tra, nếu mật độ rầy còn cao tiếp tục phun lần 2 (lần 2 phun sau lần 1 từ 5 đến 7 ngày). Phun trực tiếp vào gốc lúa nơi rầy tập trung gây hại. Khi phun thuốc cần tiến hành rẽ hàng, áp vòi phun vào gốc, thân cây để tăng hiệu quả tiếp xúc của thuốc.

- Sâu đục thân lúa bướm 2 chấm: Sâu đục vào thân cây lúa gây héo dảnh, bông bạc làm giảm năng suất, sản lượng. Có thể sử dụng một trong các loại thuốc có hoạt chất để phòng chống như: *Abamectin* (Aremec 45EC, Reasgant 3.6EC, Shepatin 90EC...); *Alpha-cypermethrin* (Pertox 5EC, Cyfitox 300EC,...); *Cartap* (Gà nòi 4GR, 95SP; Padan 4GR, 95SP; Patox 4GR, 95SP...).

- Đối với sâu cuốn lá nhỏ: Kiểm tra đồng ruộng nếu thấy mật độ sâu cuốn lá nhỏ gây hại cao, có thể sử dụng một số loại thuốc có hoạt chất để phòng trừ như: *Abamectin* (Catex 3.6EC, 100WG, Alfatin 18EC, Aremec 45EC...); *Emamectin benzoate* (Rholam 20EC, Comda gold 5WG, Dylan 2EC, Fastish 116WG...)... Phun khi sâu non tuổi nhỏ để tăng hiệu quả phòng trừ.

- Đối với bọ xít dài: Chích hút vào hạt lúa từ giai đoạn ngâm sữa làm giảm chất lượng gạo. Có thể sử dụng một trong các loại thuốc có hoạt chất sau để phòng trừ như: *Emamectin benzoate* (Rholam 20EC, Eska 250EC...),...

*** Lưu ý:**

- Đọc kỹ hướng dẫn trên vỏ bao bì thuốc trước khi sử dụng, sử dụng thuốc theo nguyên tắc 4 đúng. Thu gom bao bì thuốc sau sử dụng để đúng nơi quy định.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị Trung tâm Dịch vụ, hỗ trợ phát triển nông nghiệp các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan chuyên môn liên quan quan tâm phối hợp, chỉ đạo và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Đ/c Nguyễn Đức Điền - PGĐ Sở;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, Phòng Kinh tế thị xã, thành phố;
- Trung tâm Khuyến nông;
- Đ/c Chi cục trưởng;
- Lưu: VT, NV.

**KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**

Phạm Đình Vinh